

Dosing for Infants and Children From Your Healthcare Professional

If possible, use weight to dose; otherwise, use age.

Dosificación para Bebés y Niños Recomendada por su Médico

De ser posible, use el peso para determinar la dosis; de lo contrario, use la edad.



Infants' TYLENOL® Oral Suspension

Active Ingredient:
Acetaminophen 160 mg
(in each 5 mL)

Use product only as directed.

Dose: Every 4 hours as needed.
DO NOT GIVE MORE THAN 5 DOSES IN 24 HOURS.





mL = milliliter

Ingrediente activo:
Acetaminofén 160 mg
(por cada 5 ml)

Use únicamente según las indicaciones.

Dosis: Cada 4 horas según sea necesario. **NO EXCEDA MÁS DE 5 DOSIS EN 24 HORAS.**

ml = mililitro

WEIGHT (PESO)	6-11 lbs	12-17 lbs	18-23 lbs	24-35 lbs
AGE (EDAD)	0-3 months/meses	4-11 months/meses	12-23 months/meses	2-3 years/años
DOSE (DOSIS)	1.25 mL 	2.5 mL 	3.75 mL 	5 mL 



Children's TYLENOL® Oral Suspension

Active Ingredient:
Acetaminophen 160 mg
(in each 5 mL)

Use product only as directed.

Dose: Every 4 hours as needed.
DO NOT GIVE MORE THAN 5 DOSES IN 24 HOURS.






mL = milliliter

Ingrediente activo:
Acetaminofén 160 mg
(por cada 5 ml)

Use únicamente según las indicaciones.

Dosis: Cada 4 horas según sea necesario. **NO EXCEDA MÁS DE 5 DOSIS EN 24 HORAS.**

ml = mililitro

WEIGHT (PESO)	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE (EDAD)	2-3 years/años	4-5 years/años	6-8 years/años	9-10 years/años	11 years/años
DOSE (DOSIS)	5 mL 	7.5 mL 	10 mL 	12.5 mL 	15 mL 

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

Today's Date: _____

This dosing recommendation from your doctor will expire in 14 DAYS.

- Read and follow the label on all TYLENOL® products.
- Repeat dose every 4 hours while symptoms last.
- Do NOT give more than 5 doses in 24 hours.
- Do NOT use with any other product containing acetaminophen.
- Use only the dosing device (syringe or dosing cup) that came with the product.
- All Infants' TYLENOL® and Children's TYLENOL® Oral Suspension products have the same acetaminophen concentration (160 mg/5 mL).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO DEL PRODUCTO

Fecha de hoy: _____

Esta dosis recomendada por su médico expirará en 14 DÍAS.

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta en todos los productos TYLENOL®.
- Repita la dosis cada 4 horas mientras los síntomas persistan.
- NO exceda más de 5 dosis en 24 horas.
- NO lo use con ningún otro producto que contenga acetaminofén.
- Use únicamente el dosificador (jeringa o medidor) que viene con el producto.
- Todos los productos TYLENOL® para bebés y TYLENOL® para niños, suspensión oral contienen la misma concentración de acetaminofén (160 mg/5 ml).